Mourisco de Semente

Vass7R03s356-360

Collection Vassal-Montpellier

1502Mtp2

Manniped of 360 mente

Maurisco de Semente n 7 R 3 1 356.360







NOM Maurisio de Semente EMPLACEMENT 7R31356.360										
Souche	Nbre yeux	Débourrem début mi/	ent Nbi déb. gra	re Ferti- ap lité	Florais debut mi/	on i fin	Véz début	raison mi/v	fin	Maturité
2 2 4 5	f f2	21.3 × 2,  le 2.4.91  + 15	4 × 0	Pour : Baie : d Couleur Saveur	MC - G - isc-sph-e : B-Gr-R : s - m - : avec -	ill ; 11 - P   11 - P   11 - OV - OI 15 - Rg - N 16 ar - fe	Dim: bov-cyl <u>Jus</u> : ox - he	-fus inc -		: L = 15- C

Dours ANNEE NOM Mourises de semente EMPLACEMENT 7 R3 1 356. 360 150202 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche X 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill ; 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

	NOM Mourise de Semente EMPLACEMENT 7 R 3 1 356.360											
	1502.02											
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Hbre grap	Ferti- lité	Floraison debut mi/f   fin		Véraison début mi/v fi		fin	Maturit <b>é</b>	
2 3 * 5	1669e	27.3	3.4.	4	Couleu Saveur	: G -  TG -  disc-:  r : B-0  : s -  : ave	M · P  Mil  S - M  sph-el  Gr-Rs-  m - a  c - ap	Dim  1: - P D  1-ov-  Rg-N  r - fe  yrène	im : obov-c	Compa yl-fus : inc	cité:	43 : L - M -C

N° d'ordre :

Mourisco de semente

Désignation : Emplacement : 7 R3 A. 356-360 (8.2)

# (A) BOURGEONNEMENT

Epancui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Clabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzées ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Wiales - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cui rées 211 - vertes 212 autres 213.

(Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 25me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## face inféricure

Pervores: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limos: glabos 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux (24 - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 - sans vill@sité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou caivrées 232 - verte 733.

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 239 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Total ement - sillon - partiellement.

-Calvo 88

dantanlantanlantanlantan

Mourisco de semente 7R30-356-360 (0.2) No d'ordre :

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotolé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entierement - partiellement.

Mérithalle : dcs coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

Noeuds

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 261. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Mourisco de sémente

Désignation :

Emplacement :

7 R3 A- 356-360 (612)

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 -

aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 152 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161. light que joint jetiolaire

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 de duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 88

alantaalaataalaataal

Mourisco de semente 7 R3 s - 356 - 360 (s. 1)

## GRAPPE

N° d'ordre

Désignation : Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 18 x ). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration regulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière [07] - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - pen apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34) A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène. Calvo 88

# Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 200 3

Code clone 02

Code cepage 1502 Nom copage Mourisco de semente moir Observateur TD

Emplacement: 7 R3 1356-360

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique @ aplatie 5 oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtie 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 101 lenticelles absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ) - présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence () - présence ()

oiv 353 longueur entrenoeuds: tres courts (260mm) & courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 60 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit ( 5mm) 6 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 = moyen 5 = ele e 7 - très élevé 9. orv 553 aptitude à la rhizogenèse (rès faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends aplates 1 movens (1 - saillants 3

N° d'ordre :

Désignation: Marinco de Semente

```
Emplacement : 7 R 3 A 356.360
Angle des nervures
                                    : 1 - (2) - (3)
                                       : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                       : 7 - (8) - 9
L1/L
                                       : (10) - (11)
L2/L
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                               : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U: (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                         : 40 - (41)
Dents : forme
                                        : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 59 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92